

Оксибутират натрия: действие на организм, передозировка, опасность

Натрия оксибутират используют в хирургической практике как неингаляционное наркотическое средство при неполостных малотравматичных операциях с сохранением спонтанного дыхания.

Препарат проявляет седативное, снотворное, наркотическое, центральное миорелаксирующее действие противосудорожный и противошоковый эффект, усиливает болеутоляющую активность наркотических и ненаркотических анальгетиков.

В последние годы препарат приобрел большую популярность среди молодежи в качестве рекреационного психоактивного вещества. В подростковых кругах его прозвали жидким экстази из-за некоторой схожести в эффектах. Сленговое названия «бутират», «бутерат», «оксик», «буратино», «буратинат натрия», «оксана», «ксюха», «вода», «бут», «бúтик», «флюк», «горячая вода».

Выпускается в форме кристаллического порошка светлого цвета. По внешнему виду напоминает столовую соль, мелко кристаллический порошок. Вещество хорошо растворяется в воде и спирте. Лекарство расфасовано во флаконы. Для получения наркотического опьянения употребляют его в основном в жидком виде, в качестве дозатора используя крышечки от пластиковых бутылок: 1 крышка - 1 доза.

Начало действия препарата: через 10 - 20 минут после перорального приёма. Длительность действия: 1 - 3 часа. Последствие (остаточные эффекты): 2 - 4 часа. Действие препарата существенно усиливается при приёме натошак.

Оксибутират натрия вызывает приятное чувство расслабления и спокойствия. Часто возникает безмятежность, чувственность, мягкая эйфория, говорливость. Беспокойство и напряжённость растворяются, превращаясь в чувство эмоционального тепла, благополучия и расслабленности. На следующее утро эффект похмелья не возникает. Наоборот, многие сообщают о приливе свежести, энергии.

Препарат отличается выраженной кривой «доза-эффект». Удвоение дозы может привести к четырёхкратному возрастанию эффекта.

- При принятии **малой дозы** эффекты подобны лёгкому алкогольному опьянению. Лёгкая расслабленность, повышенная общительность, снижение точности движений, лёгкое головокружение.
- **Средние дозы:** усиливается релаксация. Некоторые отмечают повышенную чувствительность к музыке, тягу к танцам. Улучшается настроение. Появляется некоторая сбивчивость речи, неадекватность, дурашливость. Иногда возникает тошнота. Во многих случаях

отмечается гиперсексуальность: повышенная чувствительность к прикосновениям.

- **Высокие дозы** вызывают сон. При сохранённом сознании - нарушение равновесия, слабость, разбитость. Более существенное превышение дозы вызывает сон.
- **Передозировка** возникает очень легко. Например, дополнительная четверть грамма - и эйфория сменяется чувством тошноты и рвотой, может вызвать неконтрольное поведение, сопровождающееся провалами в памяти. При сочетании с другими психотропными препаратами ситуация может стать неуправляемой. Например, сочетание с алкоголем вызывает рвоту и потерю сознания, что, в свою очередь, может вызвать асфиксию и смерть.